

Tab. 5: Knollenbonituren beider Sorten in den einzelnen Varianten über drei Jahre

Sorte (S)	Variante (V)	Drahtwurm % Mittel						Dry Core % Mittel						Rhizoctonia Index Mittel						Schorf Index Mittel					
		2008	2009	2010	SxV	S	V	2008	2009	2010	SxV	S	V	2008	2009	2010	SxV	S	V	2008	2009	2010	SxV	S	V
Belana	nicht vorgekeimt	25	14	3	14			74	28	18	40			1,1	1,2	1,1	1,1			1,1	2,0	2,4	1,8		
	vorgekeimt	38	6	2	15			67	20	4	30			1,1	1,1	1,0	1,1			1,1	-*	2,9	2,0		
	Keimabbruch	12	8	0	7	12		45	24	6	25	32		1,0	1,1	1,0	1,1	1,1		1,0	1,9	2,9	1,9	1,9	
	Jahresmittel Belana	25	9	2				62	24	9				1,1	1,1	1,0				1,1	2,0	2,7			
Laura	nicht vorgekeimt	35	12	4	17		15	92	28	19	46		43	2,5	1,2	1,0	1,6		1,3	1,1	2,0	1,8	1,6		1,7
	vorgekeimt	24	6	5	12		13	64	20	17	34		32	2,8	1,2	1,0	1,7		1,4	1,0	2,2	2,1	1,8		1,9
	Keimabbruch	36	8	7	17	15	12	83	18	13	38	39	31	2,9	1,3	1,1	1,8	1,7	1,4	1,1	1,8	2,3	1,7	1,7	1,8
	Jahresmittel Laura	31	9	5				80	22	16				2,7	1,2	1,0				1,1	2,0	2,1			
	Gesamt	28	9	4				71	23	13				1,9	1,2	1,0				1,1	2,0	2,4			

*nicht auswertbar