

Eigenschaften der Winterweizensorten nach Einstufungen der BSA/BAES bzw. eigene Einschätzungen

E-Sorten															A-Sorten				
Sorte	Akteur	Capo	Butaro	Arnold	Genius	Lukullus	Famulus	Florian	Midas	Tobias	Artis	Xerxes	Energ	Naturastar	Discus	Kerubino	JB Asano	Estivus	
Zulassung Jahr (Land)	2003 (D)	EU 1989 (A)	2009 (D)	EU 2009 (A)	2010 (D)	EU 2008 (A)	2010 (D)	2010 (D)	EU 2008 (A)	EU 2011 (A)	2010 (D)	EU 2011 (A)	EU 2009 (A)	2002 (D)	2007 (D)	EU 2004 (A)	2008 (D)	2012 (D)	
Züchter	DSV Saaten	Probstd. Saatzucht	Spieß	Probstd. Saatzucht	Nordsaat	Saatbau Linz	DSV Saaten	Nordsaat	Probstdorfer Saatzucht	Probstd. Saatzucht	DSV-Saaten	DSV-Saaten	Saatzucht Edelhof	Saatzucht Schweiger	SaKa Pflanzenzucht	IG Pflanzenzucht	Breun	Strube	
Begrünnung	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	nein	ja	ja	nein	nein	ja	nein	ja	nein	nein	nein	
Standort-eignung	auch auf leichteren, trockeneren Böden	(ja)	(ja)		ja		ja		ja	ja		ja		(ja)	ja	(ja)			
	mittel-schwerere Böden	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	
Auswinterung	5	3	-	3	4	5	3	4	4	4	4	6	5*	-	4	3	6	-	
Unkrautunterdrückung	Bodenbedeckung EC 21-25	mittel	mittel	mittel	dichter	lückiger	mittel	mittel	lückiger	mittel	mittel	lückiger	mittel	dichter	lückiger	mittel	dichter	lückiger	
	Massenbildung EC 32-37	mittel	mittel	gering-mittel	mittel-stark	gering	mittel	gering-mittel	gering	mittel-stark	mittel	gering-mittel	gering-mittel	mittel-stark	mittel-stark	gering-mittel	mittel-stark	gering-mittel	
	Blatthaltung (P = planophiler/waagerechter; E = erectophiler/senkrechter Pflanzenlänge/Wuchshöhe)	E	P	P	P	E	E	E	E	E	P	E		P	P	E	E	E	
		6	7	8	6	5	5	5	5	5	7	6	6	6*	7	6	4	5	5
Lagergefahr	Lagerneigung	3	6,5	9	4	5	5	5	4	5	4	5	3	6	6	3	5	3	
Krankheiten	Mehltau	7	5	3	4	2	3	6	2	3	5	2	3	4	1	5	3	2	
	Braunrost	4	3	4	4	3	4	6	3	4	4	6	3	5	4	7	5	2	
	Gelbrost	9	3	6	3	2	6	2	5	6	2	3	5	-	3	3	4	4	
	Blattseptoria	6	6	4	7	6	6	4	6	5	5	6	3	6	4	5	6	5	
	Ährenfusarium	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5	3	
Ertragskomponenten	Typ (A = einzelne, große Ähren; M = viele, kleine Ähren)	Ä	Ä	Ä	M	Ä	M	M	Ä	M	M	Ä		Ä	Ä	M	M	Ä	
	Bestandesdichte (Ähren/m²)	5	5	4	mittel-hoch	5	mittel	5	4	mittel	mittel	5	gering-mittel	5	6	mittel	5	5	
	Kornzahl/Ähre	5	3	2	gering	5	gering	4	6	gering	mittel	5	hoch	7	5	mittel	5	7	
	TKM	6	6	6	6	5	7	5	5	7	6	5	6	4	4	5	8	5	
	Kornerttrag	4-5	3-4	1	3-4	5-6	5-7	4-5	5-6	5-7	2-4	4	7	6*	4	6	7	7-8	7
Qualität	Proteingehalt	8	6	9	9	8	6,5	7	8	5	8	6	6	7	6	4	5	4	
	Klebergehalt	mittel-hoch	7	hoch-sehr hoch	8	mittel-hoch	7	mittel-hoch	mittel-hoch	5	9		8	hoch	mittel-hoch	5			
	Sedimentationswert	9	8	9	9	9	8	8	8	7	8	9	7	8	7	6	6	6	
	Volumenausbeute	8	7	9	8	9	7	8	9	7	8	9	6	7	6	6	6	6	
	Fallzahl	8	6	6	5	9	7	8	9	7	6	8	6	8	7	5	6	8	

BSA = Bundessortenamt (Hrsg.): Beschreibende Sortenliste; BAES = Bundesamt für Ernährungssicherheit in Österreich + AGES = Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Hrsg.): Österreichische Beschreibende Sortenlist

Noten: 1= sehr niedrig, gering, kurz oder fehlend; 5 = mittel; 9 = sehr hoch, stark oder lang

* Züchterangaben

unerwünscht mittel erwünscht