

Tab. : Proteingehalte % der Dinkelsorten im ABG 3 "Lehmige Standorte West" und ABG 9 "Marsch"

Proteingehalt %	ABG3 "Lehmige Standorte West"						ABG9 "Marsch"			Mittel 2014-2016	Anzahl Versuche
	Nordrhein-Westfalen Lichtenau			Hessen Alsfeld			Niedersachsen Schoonorth				
Nr. Sorte	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017		
1 Franckenkorn	zu wenig Material	15,9		13,0	13,3		15,4	15,8	12,4	14,3	6
2 Zollernspelz		16,6		12,9	14,0		13,2	14,1	12,8	13,9	6
3 Oberkulmer Rotkorn		17,4		-	14,7		-	15,7	14,7	15,6	4
4 Emiliano (spelzfrei)		15,7		13,9	13,7		17,6	13,9	12,6	14,6	6
5 Zürcher Oberländer Rotkorn		17,1		-	-		-	-	-	17,1	1
6 Badensonne		-		-	-		-	-	11,1	11,1	1
7 Comburger		-		-	-		-	-	13,2	13,2	1
8 Hohenloher		-		-	-		-	-	12,1	12,1	1
9 Ceralio		16,0		-	-		-	-	-	16,0	1
10 Heuholzer Kolben (Emmer)		18,0		-	-		-	-	-	18,0	1
11 Attergauer Dinkel		17,3		15,3	15,3		-	18,2	-	16,5	4
Versuchsmittel		16,2		13,5	13,9		15,5	15,3	12,7	14,8	3