

Tab. : Proteingehalte % der Dinkelsorten im ABG 3 "Lehmige Standorte West" und ABG 9 "Marsch"

Tab.: Proteingehalte % der Dinkelsorten im ABG 3 "Lehmige Standorte west." und ABG 9 "Marsch"											
Proteingehalt %	ABG3 "Lehmige Standorte West"						ABG9 "Marsch"			Mittel 2014-2016	Anzahl Versuche
	Nordrhein-Westfalen			Hessen			Niedersachsen				
Nr. Sorte	Lichtenau			Alsfeld			Schoonorth				
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017		
1 Franckenkorn	zu wenig Material	15,9		13,0	13,3		15,4	15,8	12,4	14,3	6
2 Zollernspelz		16,6		12,9	14,0		13,2	14,1	12,8	13,9	6
3 Oberkulmer Rotkorn		17,4		-	14,7		-	15,7	14,7	15,6	4
4 Emiliano (spelzfrei)		15,7		13,9	13,7		17,6	13,9	12,6	14,6	6
5 Zürcher Oberländer Rotkorn		17,1		-	-		-	-	-	17,1	1
6 Badensonne		-		-	-		-	-	11,1	11,1	1
7 Comburger		-		-	-		-	-	13,2	13,2	1
8 Hohenloher		-		-	-		-	-	12,1	12,1	1
9 Ceralio		16,0		-	-		-	-	-	16,0	1
10 Heuholzer Kolben (Emmer)		18,0		-	-		-	-	-	18,0	1
11 Attergauer Dinkel		17,3		15,3	15,3		-	18,2	-	16,5	4
Versuchsmittel		16,2		13,5	13,9		15,5	15,3	12,7	14,8	3

Tab. : Feuchtklebergehalte % der Dinkelsorten im ABG 3 "Lehmige Standorte West" und ABG 9 "Marsch"

Feuchtklebergehalte %	ABG3 "Lehmige Standorte West"						ABG9 "Marsch"			Mittel 2014-2016	Anzahl Versuche
	Nordrhein-Westfalen Lichtenau			Hessen Alsfeld			Niedersachsen Schoonorth				
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017		
Nr. Sorte	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017		
1 Franckenkorn	27,9	33,2		27,7	26,5		31,1	27,2	26	28,5	7
2 Zollernspelz	31,8	40,8		29,9	29,4		33,7	34,6	30,1	32,9	7
3 Oberkulmer Rotkorn	-	35,4		-	31,2		-	29,2	35,4	32,8	4
4 Emiliano (spelzfrei)	28,7	35,0		31,7	30,2		35,3	29,2	29,6	31,4	7
5 Zürcher Oberländer Rotkorn	-	39,6		-	-		-	-	-	39,6	1
6 Badensonne	-	-		-	-		-	-	23,4	23,4	1
7 Comburger	-	-		-	-		-	-	31,6	31,6	1
8 Hohenloher	-	-		-	-		-	-	25,6	25,6	1
9 Ceralio	-	35,3		-	-		-	-	-	35,3	1
10 Heuholzer Kolben (Emmer)	-	33,7		-	-		-	-	-	33,7	1
11 Attergauer Dinkel	-	36,8		33,3	31,7		46,3	35,5	-	36,7	5
Versuchsmittel	32,1	36,7		30,2	29,4		35,5	30,9	28,8	32,0	3

Tab. : Fallzahl s der Dinkelsorten im ABG 3 "Lehmige Standorte West" und ABG 9 "Marsch"

Tab. 1: Fallzahl s der Dinkelsorten im ABG 3 "Lehmige Standorte West" und ABG 9 "Marsch"												
Fallzahl s		ABG3 "Lehmige Standorte West"					ABG9 "Marsch"			Mittel 2014-2016	Anzahl Versuche	
Nr. Sorte		Nordrhein-Westfalen Lichtenau			Hessen Alsfeld		Niedersachsen Schoonorth					
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017		
1	Franckenkorn	nicht untersucht	93		448	381		247	287	384	307	6
2	Zollernspelz		153		467	399		282	264	330	316	6
3	Oberkulmer Rotkorn		62		-	362		-	260	304	247	4
4	Emiliano (spelzfrei)		196		422	436		263	332	304	326	6
5	Zürcher Oberländer Rotkorn		155		-	-		-	-	-	155	1
6	Badensonne		-		-	-		-	-	354	354	1
7	Comburger		-		-	-		-	-	291	291	1
8	Hohenloher		-		-	-		-	-	358	358	1
9	Ceralio		62		-	-		-	-	-	62	1
10	Heuholzer Kolben (Emmer)		84		-	-		-	-	-	84	1
11	Attergauer Dinkel		126		317	352		-	332	-	282	4
Versuchsmittel			129		384	362		220	275	332	253	3