

Tabelle: Knollenbonitur der Öko-Kartoffeln im Sortenversuch an den Standorten VIE und GT in 2017

Sorte	Reife- gruppe*	Koch- typ**	Rhizoctonia def. Knollen %	Rhizoc- tonia Index	Rhizoc- tonia Index	Drycore %	Drycore %	Draht- wurm %	Draht- wurm %	Schorf def. Knollen %	Schorf Index	Schorf Index
			VIE***	VIE	GT	VIE	GT	VIE	GT	VIE	VIE	GT
Avanti	sf	f	29	1,22		10		4		13	1,00	
Glorietta	sf	f	93	3,42	2,38	12	20	5	7	2	1,00	1,44
Solo	sf	f	73	2,66		28		19		9	1,04	
Corinna	sf	vf			2,06		20		22			1,28
Liliana	sf	vf	25	1,32		17		14		11	1,00	
Paroli	sf	vf			1,96		22		23			1,10
Alouette	f	f	36	1,42		15		8		12	1,00	
Goldmarie	f	f	45	1,40	1,42	5	21	4	23	6	1,04	1,06
Malika	f	f	37	1,68	3,20	14	23	8	28	13	1,00	1,44
Monique	f	f			2,46		26		8			1,06
Twiner	f	f			1,06		7		22			1,12
Julinka	f	vf	28	1,16	2,38	5	13	2	9	16	1,06	1,08
Lisana	f	vf	38	1,44		14		13		48	1,08	
Nixe	f	vf	70	1,96		13		6		8	1,00	
Ranomi	f	vf	25	1,22	1,06	9	13	4	21	5	1,00	1,06
Sunshine	f	vf			1,26		7		25			1,00
Wega ¹	f	vf	2	1,04	1,14	19	8	14	14	11	1,00	1,02
Valdivia	f-mf	f			3,12		24		5			1,00
Allians ¹	mf	f	61	1,48	1,46	9	9	4	7	16	1,02	1,26
Almonda	mf	f	25	1,66	1,18	9	8	1	13	18	1,02	1,02
Bernina	mf	f	46	1,78		24		16		11	1,02	
Ditta ¹	mf	f	46	1,56	1,26	12	18	1	20	20	1,02	1,20
Loreley	mf	f	48	1,66		7		4		1	1,00	
Montana	mf	f			3,48		26		6			1,20
Regina	mf	f	45	1,54	1,48	8	22	2	8	7	1,00	1,16
Damaris	mf	vf	32	1,22		4		0		14	1,04	
Madeira	mf	vf			1,68		11		23			1,20
Odett	mf	vf			1,38		5		26			1,06
Otolia	mf	vf	53	2,32	1,36	21	13	13	9	13	1,00	1,10
Loreen	mf	vf-f	68	2,38	2,56	14	28	2	18	18	1,08	1,30
Swing	mf	vf-m	57	2,20		10		5		6	1,00	
Carulus	mf	m	57	1,84	1,68	3	11	2	9	10	1,02	1,06
Filou	mf	m			4,06		11		4			1,04
Alberta	mf-ms	m	70	1,44	1,74	21	20	9	20	9	1,00	1,10

* sf = sehr früh, f = früh, mf = mittelfrüh, ms = mittels ** f = festkochend, vf = vorwiegend festkochend, m = mehligkochend

***VIE = Viersen, GT = Gütersloh

¹ Verrechnungssorten vor 2015: Allians; Ditta, Agila; 2016/2017: Allians, Ditta, Wega