

Tab.: Rohproteingehalte (%) der Wintergerstensorten in NRW sowie im Vergleich zu den Standorten in Hessen und Niedersachsen 2015-2017 (ABG 3 „Lehmige Standorte West“)

Proteingehalte % i.TM Nr. Sorte	Nordrhein-Westfalen Kerpen			Hessen Alsfeld-Liederbach			Niedersachsen Wiebrechtshausen			Mittel 2017	Mittel 2015- 2017	Anzahl Versuche 2015-2017
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017			
1 Highlight	8,0	9,5	10,9	9,1	10,7	10,0	11,0	10,5	10,9	10,6	10,1	9
2 Lomerit	7,4	8,6	10,6	9,0	9,8	9,2	10,4	10,2	10,4	10,1	9,5	9
3 Semper	7,8	9,5	10,1	9,3	10,2	10,0	10,7	10,5	11,0	10,4	9,9	9
4 Titus	7,5	8,9	10,6	9,1	10,2	10,1	10,8	10,1	10,9	10,5	9,8	9
5 Tamina	7,6	8,9	10,3	8,3	9,8	9,5	10,5	9,8	10,4	10,1	9,5	9
6 Quadriga	7,6	8,9	10,6	8,5	10,2	9,4	10,1	10,0	10,5	10,2	9,5	9
7 SU Ellen	7,3	9,0	10,5	9,0	10,3	10,4	10,2	10,1	10,8	10,6	9,7	9
8 KWS Keeper	7,2	9,0	10,2	8,3	10,1	9,1	11,5	9,9	10,6	10,0	9,5	9
9 Kaylin	-	9,9	10,8	-	11,4	10,0	-	11,0	11,1	10,6	10,7	6
10 KWS Infinity	-	-	10,8	-	-	9,6	-	-	10,9	10,4	10,4	3
Versuchsmittel	7,6	9,2	10,7	8,9	10,3	9,7	10,7	10,2	10,8	10,3	9,9	8