

Tab. : Gelbrostbefall (Boniturnote 1 = der Winterweizensorten im LSV an den Standorten des AGB 3 "Lehmige Standorte West" 2015

Gelbrostbefall (Boniturnote 1-9)			Nordrhein-Westfalen			Hessen		Niedersachsen	alle Standorte
			Warstein-Belecke (Soest, Lehm, AZ 52) 01.06.15	Dörentrup- Wendlinghausen (Lippe, sandiger Lehm, AZ 65) 25.06.15	Lichtenau (Paderborn, Lehm, AZ 42)	Alsfeld-Liederbach (Vogelsberg, sandiger Lehm, AZ 55)	Frankenhausen (Kassel, schluffiger Lehm, AZ 70)	Wiebrechtshausen (Northeim, schluffiger Lehm, AZ 70-75)	Mittel 2015
Nr.	Winterweizen-Sorte								
1	Capo*	(E)	2,0	2,5	3,0	-	-	-	2,5
2	Butaro*	E	1,0	1,5	2,5	2,0	-	3,3	2,1
3	Genius	E	1,0	1,8	2,0	-	-	-	1,6
4	Lukullus*	(E)	1,0	4,5	2,5	4,0	-	6,0	3,6
5	Tobias*	(E)	1,0	2,0	2,5	3,0	-	4,5	2,6
6	Arktis	E	1,0	1,3	2,8	2,0	3,5	2,5	2,2
7	Xerxes*	(E)	1,0	5,0	2,3	5,0	6,0	5,8	4,2
8	KWS Milaneco*	E	1,0	2,0	3,0	3,0	4,5	5,8	3,2
9	Gourmet*	E	1,8	1,0	2,0	1,0	2,0	2,3	1,7
10	Bernstein	E	1,0	1,0	2,3	3,0	2,5	2,0	2,0
11	Axioma	E	1,0	2,0	2,0	2,0	3,3	2,8	2,2
12	Kobold	E	1,8	2,0	2,0	3,0	4,0	3,3	2,7
13	Angelus	E	1,0	4,5	2,5	6,0	6,8	5,5	4,4
14	Naturastar*	A	-	6,3	-	8,0	8,0	-	7,4
15	Discus*	A	1,0	3,0	2,5	6,0	-	7,8	4,1
16	Julius	A	1,8	2,0	2,0	3,0	-	3,5	2,5
17	Akratos	A	1,0	5,8	3,5	-	-	-	3,4
18	Estivus	A	1,0	2,0	3,0	5,0	6,3	5,8	3,8
19	Pionier	A	1,0	2,0	2,5	2,0	5,0	3,8	2,7
20	Elixer*	C	1,0	3,0	2,0	3,0	4,8	3,3	2,8
21	Manito	C	1,8	3,0	2,3	3,0	5,5	4,8	3,4
Versuchsmittel			1,2	2,8	2,5	3,6	4,8	4,3	3,1