

Tab. 1: Standort- und Versuchsdaten der Öko-LSV im ABG 3 "Lehmige Standorte West" 2016

Bundesland	NRW	Hessen	Niedersachsen
Versuchsort	Kerpen	Alsfeld-Liederbach	Wiebrechts-hausen
Landkreis	Rhein-Erft-Kreis	Vogelsberg	Northeim
Höhe NN	92	230	146
NS (JM in mm)	600	610	
T (JM in °C)	9,8	7,8	
Bodenart	sL	sL	uL
Ackerzahl	66	53	80
Vorfrucht	Futtererbse	Klee gras	Klee gras
Vor-Vorfrucht	Wintertriticale	Klee gras	Wintergerste
org. Düngung	20 t Champost/ha	keine	keine
Saatstärke K/m ²	400	350	350
Saattermin	05.10.2015	02.10.2015	29.09.2015
Erntetermin	06.07.2016	08.07.2016	07.07.2016
Nmin (kg/ha) 0-90cm	13*(0-60cm)	50	23
pH-Wert	7	6	7
P mg/100 g	7 C	18	7,8 C
K mg/100 g	7,5 B	23	11,6 C
Mg mg/100 g	5	19	5 B
mechanische Unkrautregulierung	einmal Treffler-Striegel	einmal Zinkenstriegel	fünfmal (davon zweimal im Winter) Zinkenstriegel