

Tab. 5: Rohproteingehalte (%) der Wintergerstensorten in NRW sowie im Vergleich zu den Standorten in Hessen und Niedersachsen 2016-2018

Proteingehalte % i.TM Nr. Sorte		Nordrhein-Westfalen Kerpen			Hessen Alsfeld-Liederbach			Niedersachsen Wiebrechtshausen			Mittel 2018	Mittel 2016- 2018	Anzahl Versuche 2016-2018
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018			
1	Lomerit	8,6	10,6	13,4	9,8	9,2	9,4	10,2	10,4	10,7	11,2	10,3	9
2	Semper	9,5	10,1	12,8	10,2	10,0	9,8	10,5	11,0	11,0	11,2	10,5	9
3	Titus	8,9	10,6	13,4	10,2	10,1	8,8	10,1	10,9	11,6	11,3	10,5	9
4	Quadriga	8,9	10,6	13,8	10,2	9,4	8,8	10,0	10,5	10,5	11,0	10,3	9
5	Kaylin	9,9	10,8	15,0	11,4	10,0	9,0	11,0	11,1	11,8	11,9	11,1	9
6	KWS Infinity	-	10,8	14,0	-	9,6	8,2	-	10,9	10,6	10,9	10,7	6
7	Hedwig	-	-	13,5	-	-	8,8	-	-	10,9	11,1	11,1	3
8	KWS Higgins	-	-	13,3	-	-	8,6	-	-	10,1	10,7	10,7	3
9	Lucienne	-	-	13,4	-	-	9,6	-	-	11,4	11,5	11,5	3
10	Cayu	-	-	15,1	-	-	-	-	-	-	15,1	15,1	1
11	Sonnengold	-	-	13,8	-	-	-	-	-	11,5	12,7	12,7	2
Versuchsmittel		9,2	10,7	13,8	10,3	9,7	9,0	10,2	10,8	10,9	11,7	11,3	6