

Tab.: Gelbrostbefall (Boniturnote 1 = der Winterweizensorten im LSV an den Standorten des AGB 3 "Lehmige Standorte West" 2014

Gelbrostbefall (Boniturnote 1-9)			Nordrhein-Westfalen				Hessen	Niedersachsen	alle Standorte
			Warstein-Belecke (Soest, Lehm, AZ 52) 01.07.14	Dörentrup- Wendlinghausen (Lippe, sandiger Lehm, AZ 65) 06.05.14	Lichtenau (Paderborn, Lehm, AZ 42) 19.05.14 10.07.14		Alsfeld-Liederbach (Vogelsberg, sandiger Lehm, AZ 55) 14.05.14	Wiebrechtshausen (Northeim, schluffiger Lehm, AZ 70-75) 2014	Mittel 2014
Nr.	Sorte								
1	Capo	(E)	1,0	3,8	2,0	4,5	2,0	4,0	2,9
2	Butaro	E	1,0	3,8	2,0	4,0	2,0	2,8	2,6
3	Arnold	(E)	1,0	4,3	2,0	4,0	3,0	4,7	3,2
4	Lukullus	(E)	3,3	3,8	2,3	5,0	2,0	3,2	3,2
5	Famulus	E	1,0	2,3	2,0	4,8	2,0	2,0	2,3
6	Midas	(E)	2,8	3,5	2,0	4,5	2,0	2,2	2,8
7	Kerubino	(E)	5,8	5,0	2,3	4,8	4,0	5,5	4,5
8	Tobias	(E)	1,0	3,5	2,0	4,0	3,0	3,3	2,8
9	Arktis	E	1,0	4,5	2,0	4,8	2,0	3,2	2,9
10	Xerxes	(E)	3,8	2,5	2,3	4,8	3,0	3,7	3,3
11	Energo	(E)	1,0	3,8	2,0	5,0	3,0	3,5	3,0
12	KWS Melaneco	E	1,0	2,8	2,0	4,8	2,0	3,0	2,6
13	Gourmet	E	1,0	2,3	2,0	4,3	2,0	3,0	2,4
14	Naturastar	A	5,5	7,0	5,5	7,0	5,0	6,3	6,1
15	Discus	A	2,8	5,3	3,8	6,0	5,0	5,2	4,7
16	JB Asano	A	4,5	7,0	6,8	8,0	6,0	8,0	6,7
17	Estivus	A	2,8	3,5	2,0	4,3	3,0	4,0	3,3
18	Pionier	A	1,0	3,8	2,3	5,0	2,0	3,0	2,8
19	Elixer	C	1,0	4,0	2,0	3,0	3,0	3,7	2,8
Versuchsmittel			2,2	4,0	2,6	4,9	2,9	3,9	3,4