

Tabelle: Rohproteingehalte (%) der Winterroggensorten in NRW sowie im Vergleich zu den Standorten in Hessen und Niedersachsen 2012-2014 (ABG 3 „Lehmige Standorte West“)

Rohproteingehalt % TM Typ			Nordrhein-Westfalen			Hessen			Niedersachsen			Mittel 2012-2014
Nr. Sorte			Lichtenau			Alsfeld-Liederbach			Wiebrechtshausen			
			2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	
1	Conduct	P	keine Versuche	11,4	7,3	9,6	8,4	9,9	10,6	nicht auswertbar	nicht auswertbar	9,5
2	Dankowskie Diament	P		11,1	7,3	10,0	8,6	-	10,6			9,5
3	Dukato	P		10,9	6,8	9,7	8,4	10,1	10,4			9,4
4	Palazzo	H		10,6	6,5	9,0	7,8	9,8	9,9			8,9
5	Firmament	P		10,5	7,3	-	8,8	9,5	-			9,0
6	Elego	P		10,3	6,9	9,4	8,6	10,0	10,7			9,3
7	Inspektor	P		-	7,2	-	-	10,0	-			8,6
8	SU Performer	H		-	6,3	-	-	9,7	-			8,0
Versuchsmittel (dt/ha)				10,8	6,9	9,5	8,4	9,9	10,4			9,0

P = Populationsroggen; H = Hybridroggen