

Indikator	Warnwert	10% --	25% -	Median	75% +	90% ++	Zielwert
Anteil eutergesunder Kühe (Milchzellgehalt ≤ 100.000 /ml N)	≤ 50	43,2	52,8	62,0	69,8	76,2	≥ 75
Anteil Tiere mit deutlich erhöhtem Zellgehalt (Milchzellgehalt ≥ 400.000 /ml N)	≥ 15	19,4	14,8	10,8	7,5	5,0	≤ 5
Neuinfektionsrate in der Laktation [%]	≥ 25	27,8	21,9	16,9	13,1	10,3	≤ 15
Erstlaktierendenmastitisrate [%]	≥ 30	46,4	34,4	25,0	15,0	3,8	≤ 15
Anteil chronisch kranker Tiere mit schlechten Heilungsaussichten	≥ 5	2,9	1,8	0,9	0,3	0,0	≤ 1
Neuinfektionsrate Trockenperiode [%]	≥ 30	46,2	33,3	23,1	14,3	5,9	≤ 15
Heilungsrate in der Trockenperiode [%]	≤ 50	33,3	46,9	60,0	70,7	80,0	≥ 75
Anteil Tiere mit Fett/Eiweiß-Quotienten $\geq 1,5$ in den ersten 10 Tagen	≥ 15	22,7	15,5	10,0	6,1	3,8	≤ 10
Anteil Kühe mit Fett/Eiweiß-Quotienten $< 1,0$ in den ersten 10 Tagen	≥ 15	20,9	14,6	9,1	5,0	2,5	≤ 5
Merzungs-/Abgangsrate der Kühe [%]	≥ 40	40,5	33,7	27,4	21,5	16,2	≤ 25
Nutzungsdauer der gemerzten Kühe [Monate]	≤ 30	29,2	34,7	41,3	49,5	60,0	≥ 48
Frühe Kälberverluste bei Erstkalbinnen [%]	≥ 10	16,4	10,0	4,8	0,0	0,0	≤ 5
Frühe Kälberverluste bei Mehrkalbskühen bis Tag 7 [%]	≥ 10	12,0	8,2	4,9	2,0	0,0	≤ 5
Kuhmortalität [%]	≥ 5	9,4	6,3	3,7	1,5	0,0	≤ 2
Anteil Kälberverluste Tag 8-28 [%]	≥ 10	4,9	2,5	0,8	0,0	0,0	≤ 5
Anteil Aufzuchtverluste Tag 29-180 [%]	≥ 10	4,8	2,4	0,0	0,0	0,0	≤ 5